

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

せき止め薬 コンコン咳止め液

第②類医薬品

- コンコン咳止め液は、せきの中枢にはたらいてせきの発作を抑え、気管支をひろげてせきをしずめます。またアレルギー性のせきや、たんを伴うせきにも優れた効果をあらわします。
- コンコン咳止め液は、苦味をおさえたのみやすいシロップ剤で、不快なせきやたんを早く抑えます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと**
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと**
(眠気があらわれることがある。)
3. **過量服用・長期連用しないこと**
(倦怠感や虚脱感等があらわれることがある。)



相談すること

1. **次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること**
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん
2. **次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること**

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	動悸、排尿困難

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合
3. **次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること**
便秘、口のかわき

効能・効果

せき、たん

用法・用量

年齢により次の1回量を添付の目盛り付きカップではかり、通常1日3回食後に服用してください。場合により1日6回まで服用しても差し支えありませんが、その場合は原則として約4時間の間隔をおいて服用してください。

年 齢	1 回 量
15歳以上	10mL
11歳以上15歳未満	6mL
8歳以上11歳未満	5mL
5歳以上8歳未満	3mL
3歳以上5歳未満	2mL
3歳未満	服用しないこと

〈用法及び用量に関する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 3歳未満の幼児には、服用させないこと。
- (3) 本品は、生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがありますが、効力に変わりありません。よく振ってから服用してください。
- (4) 服用のつど、瓶の口の周囲をよく拭いてからキャップをしっかりと閉めてください。
- (5) 目盛り付きカップは、ご使用のつど水洗い等して常に清潔に保管してください。

成分・分量 (60mL中)

成 分	含量	は た ら き
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢にはたらい、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	45mg	せきを抑え呼吸を楽にします。
ノスカピン塩酸塩水和物	45mg	気管支平滑筋をゆるめてせきをしずめます。
ジプロフィリン	120mg	気管支の収縮を抑えてせきをしずめます。
クロルフェニラミン酸塩	12mg	のどの炎症を抑えます。
無水カフェイン	75mg	抗ヒスタミン剤による眠気を抑えます。
グアイフェネシン	225mg	分泌液を高めてたんを出やすくします。
セネガ流エキス	0.9mL	粘膜からの分泌液を高めたたんを出やすくします。

添加物：白糖、サッカリンNa、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、エタノール、黒糖フレーバー、香料、エチルバニリン

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに服用すること。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

中外医薬生産株式会社 お客様相談室

電話 0595-21-3200

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

製造販売元



中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5