

ご使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

肌あれ、にきび、口内炎に ビタミンB₂主薬製剤

第3類医薬品

セラBBスタイルPC

肌あれ、にきび、口内炎などの症状は、外部要因によって起こるよりも、多くの場合内部要因（例えばストレス、偏食、酒の飲みすぎ、食生活における脂肪摂取量の増加、不規則な生活）によって起こりやすくなります。

セラBBスタイルPCは皮膚のビタミンとも呼ばれている持続性ビタミンB₂をはじめ、ビタミンB₆、ビタミンB₁、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウムの水溶性ビタミン群、さらに昔から民間薬として肌あれに使われているヨクイニン（ハトムギ）のエキスを効率良く配合した、体の内側から改善する薬です。

毎日根気よくお続けください。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

☆次の諸症状の緩和

肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、皮膚炎、湿疹、かぶれ、ただれ、目の充血、目のかゆみ、赤鼻

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

☆次の場合のビタミンB₂の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

次の量を朝夕に水又はお湯で服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1錠	2回
15歳未満	服用しないでください	

<用法及び用量に関連する注意>

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

1日量(2錠)中に次の成分を含有しています。

成分	含量(2錠中)
リポフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	20mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	50mg
ヨクイニンエキス (ヨクイニンとして)	115.4mg (1,500mg)
ニコチン酸アミド	40mg
パントテン酸カルシウム	20mg
チアミン硝化物(ビタミンB ₁ 硝酸塩)	20mg

添加物：乳酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、ステアリン酸Mg、セラック、白糖、アラビアゴム、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、黄色5号、タルク、酸化チタン、カルナウバロウ

<成分に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB₂酪酸エステルによるものですので心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 本剤は落下などの衝撃で錠剤がカケることがあるので、取扱いには注意すること。
- (5) ぬれた手で取り扱わないこと(本剤は糖衣錠のため、水分が錠剤につくと、表面の糖衣が一部とけて、変色又はむらを生じることがある。)
- (6) 容器内の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用であるため、開封後は取り除くこと。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (8) 開封後は、箱の内ブタの「開封年月日」欄に開封日を記入し、薬は説明文書とともに保管すること。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

中外医薬生産株式会社 お客様相談室

電話 0595-21-3200

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5