

ウコンエキス配合

二日酔いの
むかつき
食欲
不振に

胃の
もたれ

30mL

ネオスーサン胃腸
内服液

第3類医薬品

ネオスーサン胃腸内服液

第3類医薬品

⚠ (使用上の注意)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 2週間連続服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、
この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】1日量(30mL×2本)中
ウコン流エキス……………0.4mL
(ウコンとして400mg)
カンゾウエキス……………150mg
(カンゾウとして600mg)
ニンジンエキス……………63mg
(ニンジンとして699.3mg)
チンピエキス……………140mg
(チンピとして700mg)
ショウキョウ流エキス……0.4mL
(ショウキョウとして400mg)
ソウジヨツ流エキス……0.48mL
(ソウジヨツとして480mg)
カルニチン塩化物…………120mg
添加物としてセンプリエキス、ハッカ油、
トメントール、ホピドン、ポリオキシエ
チレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート
80、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、
安息香酸Na、白糖、プロピレングリコ
ール、香料を含有します。

ガラス：ピン
金 属：キャップ

製造販売元 02NSELCH 製造番号

中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

使用期限

【効能・効果】

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部
膨満感、消化不良、胃痛、食べ過ぎ
(過食)、飲み過ぎ(過飲)、嘔
吐、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、
はきけ(むかつき)、胃のむかつき、
二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、
悪心)。

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(30mL)
を1日2回服用してください。なお、
服用間隔は、4時間以上おしてい
てください。15歳未満は服用しない
てください。

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること

●保管及び取扱い上の注意(1)直射日光の当たらない
涼風の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届
かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)表示の使用
期限を過ぎた製品は服用しないこと。

※本品は生薬が配合されていますので、まれに沈殿を生じ
ることがあります。よく振ってから服用してください。

